


سوالات امتحان نهایی درس : حسابان ۲	ساعت شروع: ۸ صبح	تعداد صفحه: ۲	مدت امتحان: ۱۲۰ دقیقه
پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه	رشته: ریاضی و فیزیک	نام و نام خانوادگی :	تاریخ امتحان: ۱۴۰۰/۰۶/۲۰
دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسر کشور در فوبت شهر یورماه سال ۱۴۰۰ http://aee.medu.ir			

ردیف	استفاده از ماشین حساب ساده بلامانع است	نمره
------	--	------

۱	<p>درستی یا نادرستی عبارت های زیر را تعیین کنید.</p> <p>(الف) تابع $y = -\log_5 x$ در دامنه خود، یک تابع اکیداً یکنوا است.</p> <p>(ب) در بازه $0 < \theta < 2\pi$ مقدار $\tan \theta$ از مقدار $\sin \theta$ کوچکتر است.</p> <p>(پ) تابع $f(x) = [x]$ در نقطه $x = 0$ مشتق پذیر است.</p> <p>(ت) هر نقطه ای که در آن مقدار $f''(x)$ برابر صفر شود، یک نقطه عطف تابع $f(x)$ است.</p>	۱
۱	<p>جاهاي خالي را با عدد يا کلمه مناسب كامل کنيد.</p> <p>(الف) در نقطه از نمودار مقابل، مقادير f' و f'' هر دو مثبت است.</p> <p>(ب) دوره تناوب تابع تانژانت برابر می باشد.</p> <p>(پ) شیب خط مماس بر منحنی $y = -5x^3 - 2x^2 - 1$ در نقطه ای به طول ۲- واقع بر آن برابر است.</p> <p>(ت) اگر $k > 1$ باشد، نمودار $y = f(kx)$ از نمودار $y = f(x)$ در راستای محور X ها به دست می آيد.</p>	۲
۱	<p>نمودار تابع $y = f(x)$ به صورت زیر است. نمودار $g(x) = 2f(x+1)$ را رسم کرده و دامنه و برد تابع g را تعیین کنید.</p>	۳
۱	<p>با رسم نمودار تابع $f(x) = \begin{cases} -x^2 + 2 & -2 \leq x < -1 \\ -x - 1 & -1 \leq x < 1 \\ x^2 - 1 & 1 \leq x \end{cases}$ در چه بازه ای نزولی می باشد.</p>	۴
+۵	چند جمله ای $x^5 + 3x^2$ را بر حسب عامل $(x+2)$ تجزیه کنید.	۵
+۵	در حدود x را به دست آورید. $\left(\frac{1}{3}\right)^{10-2x} \leq \left(\frac{1}{81}\right)$	۶
۱/۵	دوره تناوب و مقادیر ماکزیمم و مینیمم تابع $y = 9 - 2\pi \cos\left(\frac{x}{3}\right)$ را محاسبه کنید.	۷
۱	معادله $2\sin x \cos x + 3\cos x = 0$ را حل کنید.	۸

تعداد صفحه: ۲	مدت امتحان: ۱۲۰ دقیقه	ساعت شروع: ۸ صبح	سوالات امتحان نهایی درس: حسابان ۲
نام و نام خانوادگی:	تاریخ امتحان: ۱۴۰۰/۰۶/۲۰	رشته: ریاضی و فیزیک	پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه
دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسر کشور در فوبت شهریور ماه سال ۱۴۰۰ http://aee.medu.ir			

ردیف	استفاده از ماشین حساب ساده بلامانع است	نمره
------	--	------

۱	$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin \Delta x + [-x]}{2x}$ (الف)	حدهای زیر را محاسبه کنید.
۱		اگر نمودار تابع $f(x) = \frac{(a+1)x + 7}{2x + b}$ به صورت مقابل باشد، آنگاه مقدار $a + b$ را پیدا کنید.
۱	$y = \frac{x+1}{x^2+3}$	مجانب های قائم و افقی منحنی تابع $y = \frac{x+1}{x^2+3}$ را در صورت وجود بیابید.
۱/۵	$f(x) = 4x(1- x)$	مشتق پذیری تابع $f(x) = 4x(1- x)$ را در نقطه $x = 0$ بررسی کنید.
۲/۵	$f(x) = \frac{4 \sin \frac{x}{2}}{x^2 + \sqrt{x}}$ (الف)	مشتق توابع زیر را به دست آورید. (ساده کردن مشتق الزامی نیست.)
	$g(x) = 3x(x^2 - 6x)^3 + \cos 2x$ (ب)	
۱/۵	$f(t) = \frac{24t}{t}$	تابعی با ضابطه $f(t) = \frac{24t}{t}$ مفروض است. آهنگ لحظه‌ای تغییر تابع f در لحظه $t = 4$ از آهنگ متوسط تغییر تابع f از لحظه $t = 3$ تا $t = 5$ چه مقدار بیشتر است؟
۱/۲۵	<p>ورق فلزی مستطیل شکلی، به طول ۱۶ سانتی متر و عرض ۶ سانتی متر در نظر بگیرید. می خواهیم از چهار گوشه آن مربع های کوچکی به ضلع x برش بزنیم و آن ها را کنار بگذاریم. سپس لبه جعبه را به اندازه x بر می گردانیم تا یک جعبه سر باز ساخته شود. مقدار x چقدر باشد تا حجم جعبه حداقل مقدار ممکن گردد.</p>	۱۵
۱/۲۵	$f(x) = \sqrt[3]{x-1}$	جهت تعریف تابع $f(x) = \sqrt[3]{x-1}$ را در دامنه اش بررسی کرده و نقطه عطف آن را در صورت وجود به دست آورید.
۱/۵	$f(x) = -x^3 + 6x^2 - 9$	جدول رفتار و نمودار تابع $f(x) = -x^3 + 6x^2 - 9$ رارسم کنید.
۲۰	جمع نمره	موفق و سربلند باشید.