

سؤالات امتحان نهایی درس: هندسه ۳	مدت امتحان: ۱۳۵ دقیقه	تاریخ امتحان: ۱۴۰۲/۰۳/۰۷	ساعت شروع: ۸ صبح
پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه	رشته: ریاضی- فیزیک	نام و نام خانوادگی:	تعداد صفحه: ۲
دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسر کشور در نوبت خرداد ماه سال ۱۴۰۲		مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش http://aee.medu.gov.ir	
ردیف	سؤالات (پاسخ نامه دارد)		
نمره			

استفاده از ماشین حساب ساده (دارای چهار عمل اصلی و رادیکال) مجاز است.

سوالات فصل اول

۰/۵	۱	ماتریس‌های $A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 5 & 1 \end{bmatrix}$ و $B = \begin{bmatrix} x+1 & y+2 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$ را در نظر بگیرید، اگر $A + B = \begin{bmatrix} 5 & 4 \\ 8 & 3 \end{bmatrix}$ باشد، آنگاه مقادیر $x$ و $y$ را به دست آورید.
۱/۲۵	۲	ماتریس $A = [a_{ij}]_{3 \times 3}$ به صورت $a_{ij} = \begin{cases} 1 & i=j \\ 0 & i \neq j \end{cases}$ معرفی شده است، مقدار $k$ را طوری پیدا کنید که رابطه $k kA  = 625$ برقرار باشد.
۱/۲۵	۳	در تساوی ماتریسی $A = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$ ، $A = \begin{bmatrix} 5 & 2 \\ 7 & 3 \end{bmatrix}$ ، ماتریس $A$ را به دست آورید.
۱	۴	اگر $A = \begin{bmatrix}  A  & 0 & 1 \\ 1 &  A  & 1 \\ 0 & 2 & 1 \end{bmatrix}$ باشد، مقدار $ A $ را بیابید.

سوالات فصل دوم

۰/۵	۵	الف) مکان هندسی نقاطی که از دو ضلع یک زاویه به یک فاصله‌اند، ..... آن زاویه است. ب) بیضی مکان هندسی نقاطی از یک صفحه است که از یک خط ثابت در آن صفحه و از یک نقطه ثابت غیر واقع بر آن خط در آن صفحه به یک فاصله باشد. (درست - نادرست)
۰/۷۵	۶	معادله دایره‌ای را بنویسید که $O(1,0)$ مرکز آن بوده و بر خط $x = -3$ مماس باشد.
۱/۷۵	۷	مقدار $C$ را چنان بیابید که دایره $x^2 + y^2 - 2x + 2y + C = 0$ بر دایره $(x+1)^2 + (y-1)^2 = 2$ مماس بیرون باشد.
۱/۵	۸	در شکل روبه‌رو دو نقطه $A$ و $B$ روی بیضی با کانون‌های $F$ و $F'$ قرار دارند. اگر $AF' = BF$ و همچنین $AF$ و $BF'$ یکدیگر را درون بیضی در نقطه‌ای مانند $M$ قطع کنند، نشان دهید: مثلث $FMF'$ متساوی‌الساقین است و $M$ روی قطر کوچک بیضی قرار دارد.
۱/۲۵	۹	در شکل روبه‌رو نقطه $M$ روی بیضی با کانون‌های $F$ و $F'$ قرار دارد، به طوری که $MF = 8$ و $MF' = 6$ . اگر خروج از مرکز بیضی $\frac{1}{7}$ باشد، اندازه نصف قطر کوچک بیضی را به دست آورید.
		ادامه سوالات در صفحه دوم

سؤالات امتحان نهایی درس: هندسه ۳		مدت امتحان: ۱۳۵ دقیقه		تاریخ امتحان: ۱۴۰۲/۰۳/۰۷		ساعت شروع: ۸ صبح		
پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه		رشته: ریاضی-فیزیک		نام و نام خانوادگی:		تعداد صفحه: ۲		
دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسر کشور در نوبت خرداد ماه سال ۱۴۰۲		مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش http://aee.medu.gov.ir						
ردیف	سؤالات (پاسخ نامه دارد)							نمره
۱۰	سهمی با رأس $A(1, 2)$ و کانون $F(1, -2)$ مفروض است. معادله سهمی و خط هادی آن را بنویسید.							۱/۵
۱۱	اگر اندازه گودی (عمق) یک دیش مخابراتی دو برابر شود، فاصله کانونی این دیش چه تغییری می کند؟ (با ارائه راه حل)							۰/۷۵
سؤالات فصل سوم								
۱۲	شکل کلی (نمودار) مربوط به روابط $x > -2$ ، $y^2 + x \leq 0$ را در فضای دو بعدی رسم کنید.							۰/۷۵
۱۳	<p>(الف) در فضای سه بعدی، نمودار مربوط به معادلات <math>\begin{cases} x = 2 \\ y = 1 \end{cases}</math> خطی موازی محور ..... است.</p> <p>(ب) حاصل عبارت <math>\vec{i} \cdot (\vec{i} \times \vec{j})</math> برابر صفر است. (درست - نادرست)</p> <p>(پ) زاویه بین بردارهای غیر صفر <math>\vec{a}</math> و <math>\vec{b}</math>، برابر <math>\theta</math> است. در کدامیک از موارد زیر حاصل ضرب داخلی آنها بیشترین مقدار را دارد. <math>\theta = 0</math> (۱) <math>\theta = \frac{2\pi}{3}</math> (۲) <math>\theta = \frac{\pi}{2}</math> (۳) <math>\theta = \frac{\pi}{3}</math> (۴) <math>\theta = \frac{\pi}{4}</math> (۵)</p> <p>(ت) کدامیک از بردارهای زیر، بر راستای دو بردار <math>\vec{a}</math> و <math>\vec{b}</math> عمود نیست.</p> <p>(۱) <math>\sqrt{3}\vec{a} \times (-\frac{\sqrt{3}}{3}\vec{b})</math> (۲) <math>\vec{a} \times \vec{b}</math> (۳) <math>2\vec{a} + 3\vec{b}</math> (۴) <math>\vec{b} \times \frac{\sqrt{2}}{5}\vec{a}</math></p>							۱/۵
۱۴	نقطه A به ارتفاع ۳ روی محور Z ها و نقطه $B(1, 0, 1)$ در فضا مفروض اند. فاصله مختصات وسط AB تا مبدا مختصات را حساب کنید.							۰/۷۵
۱۵	<p>نشان دهید: تصویر قائم بردار <math>\vec{a}</math> روی بردار <math>\vec{b}</math> برابر <math>\vec{a}' = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{ \vec{b} } \vec{b}</math> است.</p> 							۱/۲۵
۱۶	بردارهای $\vec{a} = \vec{i} + \vec{j}$ ، $\vec{b} = (0, 1, 1)$ و $\vec{c} = \vec{i} + \vec{k}$ بر سه یال یک متوازی السطوح منطبق هستند. اگر قاعده این متوازی السطوح توسط بردارهای $\vec{b}$ و $\vec{c}$ تولید شود، اندازه ارتفاع وارد بر این وجه را محاسبه کنید.							۱/۲۵
۱۷	زاویه بین دو بردار $\vec{a} = (2, -1, 2)$ و $\vec{b} = (1, -1, 0)$ را به دست آورید.							۱/۲۵
۱۸	بردار $\vec{a} = (4, -4, 2)$ مفروض است. بردار $\vec{b}$ غیرهم جهت با $\vec{a}$ و به طول ۱۲ را طوری بیابید که $\vec{a} \times \vec{b} = \vec{0}$ باشد.							۱/۲۵
۲۰	موفق و سربلند باشید							جمع نمره