

با شمۀ تعالیٰ

راهنمای تصحیح امتحان نهایی درس: سلامت و بهداشت	رشته: کلیه رشته ها	ساعت شروع: ۱۰ صبح	مدت امتحان: ۹۰ دقیقه
پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه		تاریخ امتحان: ۱۴۰۷/۱۰/۱۷	
دانش آموزان بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسرکشور دی ماه سال ۱۴۰۷ موکز سنجش آمورش و پرورش http://aee.medu.ir		راهنمای تصحیح	

ردیف	راهنمای تصحیح	نمره
۱	الف) درست(۰/۲۵) صفحه ۱۲ ج) نادرست(۰/۲۵) صفحه ۱۶۴	۱
۲	الف) بهداشت (۰/۲۵) صفحه ۵ ج) حفظ تعادل بدن (۰/۲۵) صفحه ۸۴ ه) ارزشمند بودن (۰/۲۵) صفحه ۱۱۲	۱/۵
۳	الف) قانون تعادل انرژی (۰/۲۵) صفحه ۳۹ ج) HDL (۰/۲۵) صفحه ۵۶ ه) افسردگی (۰/۲۵) صفحه ۱۲۱	۱/۵
۴	الف) گزینه ۱- مکانیکی (۰/۲۵) صفحه ۴۵ ج) گزینه ۴- تاب آوری (۰/۲۵) صفحه ۱۱۸	۱
۵	گروه نان (۰/۲۵) و غلات (۰/۲۵) صفحه ۲۴	۰/۵
۶	آزمایش خون مخفی در مدفوع و کولونوسکوپی (۰/۲۵) صفحه ۶۲ (یک مورد کافی است)	۰/۲۵
۷	الف) رعایت بهداشت فردی (۰/۲۵) و پرهیز از به کارگیری وسائل شخصی دیگران (۰/۲۵) صفحه ۷۰ ب) عدم استفاده از سرنگ و سوزن مصرف شده (۰/۲۵) و پرهیز از رفتارهای جنسی پرخطر (۰/۲۵) صفحه ۷۴	۱
۸	او به جای فاجعه ساختن از مشکل (۰/۲۵) و گرفتار شدن در تبعات آن، (۰/۲۵) به خود و توانایی هایش (۰/۲۵) توجه بیشتری می کند. (۰/۲۵) صفحه ۱۱۵	۱
۹	۱- بازداری (۰/۲۵) ۲- برونو ریزی (۰/۲۵) ۳- جایگزین کردن خواسته ها (۰/۲۵) صفحه ۱۲۰	۰/۷۵
۱۰	از آثار مثبت خشم این که می تواند باعث احراق حق در روابط بین فردی، گروهی و اجتماعی شود البته مشروط به اینکه آن را کنترل کنیم. اما خشم منفی به بروز مشکلات و ناراحتی های جسمی (همچون سردرد، سکته های قلبی، ناراحتی های گوارشی و...)، روانی (همچون: فشار روانی، اضطراب، افسردگی، روی آوردن به مصرف مواد مخدر و...) و اجتماعی (همچون: درمان دگی، انزوا و تنهایی و...) منجر می گردد.	۰/۵
۱۱	برای هر کدام از آثار مثبت و منفی ذکر یک مثال کافی است. هر مورد (۰/۲۵) صفحه ۱۲۳	۰/۷۵
۱۲	در اثر استفاده مشترک از قلیان بیماری های منتقله از طریق دهان (۰/۲۵) و دستان فرد آلوده (۰/۲۵)، سلامت افراد دیگر را تهدید می کند. (۰/۲۵) صفحه ۱۳۳	۰/۵
	۱- احساس جذاب شدن و مورد توجه قرار گرفتن - ۲- مستقل شدن و به بلوغ رسیدن و بزرگ شدن - ۳- اجتماعی شدن و محبوب شدن در میان همسالان - ۴- الگوبرداری از هنری شده ها و افراد معروف - ۵- مصرف دخانیات توسط والدین یا دوستان صمیمی - ۶- باورهای غلط در مورد مصرف سیگار مثل اینکه سیگار کشیدن موجب رفع عصبانیت، رفع خستگی، رفع دلشوره و اضطراب، تقویت ذهن و هضم غذا می شود. - ۷- ساده انگاری در مورد مصرف قلیان به عنوان یک ماده دخانی کم خطرتر از سیگار - ۸- اشتغال ذهنی و دغدغه های فکری - ۹- در دسترس بودن و یا قیمت پایین انواع مواد دخانی - ۱۰- وجود تنش و ناهنجاری های خانوادگی، خانواده های بی ثبات و نبود حمایت های خانوادگی - ۱۱- قبیح و ناپسند نبودن مصرف دخانیات به ویژه قلیان در اذهان ذکر ۲ مورد کافی است. هر مورد (۰/۲۵) صفحه ۱۳۴	
	عمومی	
	ادامه در صفحه بعد	

راهنمای نصیح امتحان نهایی درس: سلامت و بهداشت	رشته: کلیه رشته ها	ساعت شروع: ۱۰ صبح	مدت امتحان: ۹۰ دقیقه
پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه			تاریخ امتحان: ۱۳۹۷/۱۰/۱۷
دانش آموزان بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسرکشور دی ماه سال ۱۳۹۷			مرکز سنجش آموزش و پژوهش http://aee.medu.ir

ردیف	راهنمای تصحیح	نمره
۱۳	بارزترین آثار فوری: اختلال در سیستم اعصاب (۰/۲۵) مرکزی (۰/۲۵) آثار طولانی مدت: بیماری سیروز کبدی (۰/۲۵) صفحه ۱۳۶	۰/۷۵
۱۴	الف) دود دست سوم در واقع دود نیست، بلکه بوی سیگار است که در محیط پراکنده می شود. (۰/۵) صفحه ۱۳۵ ب) فرد معتاد کسی است که بر اثر مصرف مکرر و مداوم مواد مخدر یا دارو به آن وابسته شده باشد. (۰/۵) صفحه ۱۳۹	۱
۱۵	الف) ۲. متادون (۰/۲۵) ج) ۱. کراک (۰/۲۵) ب) ۳. حشیش (۰/۲۵)	۰/۷۵
۱۶	۱- ایمان به خدا ۲- اشتغال به تحصیل علم ۳- کسب و کار سالم ۴- پایبندی به مذهب و معنویت ۵- انجام جذی ورزش ۶- پرداختن به تفریحات سالم ذکر ۳ مورد کافی است. هر مورد (۰/۲۵) صفحه ۱۴۵	۰/۷۵
۱۷	پاسخ منفی تان (۰/۰) را مثل یک نوار ضبط شده چندین بار تکرار کنید (۰/۲۵) تا مخاطب تان مقاعد شود که نمی تواند نظر شما را عوض کند. (۰/۰) صفحه ۱۴۹	۰/۷۵
۱۸	وضعیت بدنی مناسب حالتی است که در آن کمترین (۰/۰) فشار و تنفس (۰/۰) به سیستم اسکلتی - عضلانی (۰/۰) وارد می شود. صفحه ۱۵۶	۰/۷۵
۱۹	افراد به دلایل متفاوتی همچون: ۱- عادات غلط هنگام ایستادن ۲- راه رفتن ۳- نشستن و خوابیدن ۴- اعتماد به نفس پایین و خجالتی بودن ۵- عضلات ضعیف و انعطاف ناپذیر ۶- اضافه وزن و چاقی ۷- کفش نامناسب و پاشنه بلند... دچار وضعیت بدنی نامناسب می گردند. ذکر ۲ مورد کافی است. هر مورد (۰/۰) صفحه ۱۵۶	۰/۵
۲۰	هنگام خرید، کوله پشتو را طوری انتخاب کنید که سبک تر بوده (۰/۰) و در قسمت های پشت و بندها از اسفنجه استفاده شده باشد. (۰/۰) و برای توزیع مناسب تر نیرو، بندهای شانه ای آن پهن بوده (۰/۰) و حتما دارای دو بند باشد. (۰/۰) صفحه ۱۶۳	۱
۲۱	د (۰/۰) صفحه ۱۶۵	۰/۲۵
۲۲	الف) تمرکز بر روی کاهش عوامل خطر حوادث (۰/۰) زمان وقوع حادث (۰/۰) صفحه ۱۷۰ ب) سطح ۲ (۰/۰) زمان وقوع حادث (۰/۰) صفحه ۱۷۰	۰/۷۵
۲۳	الف) مهم ترین روش قطع اکسیژن است. (۰/۰) صفحه ۱۷۶ ب) بهترین راه مبارزه، سرد کردن آتش است. (۰/۰) صفحه ۱۷۶ ج) استفاده از گاز دی اکسید کربن می باشد. (۰/۰) صفحه ۱۷۷	۰/۷۵
۲۴	کشیدن ضامن (۰/۰) صفحه ۱۷۷	۰/۲۵
۲۵	۱- برخی از عوامل به محیط سقوط مربوط آند. (۰/۰) صفحه ۱۸۱ ۲- گاهی اوقات سقوط به علت عوامل فردی اتفاق می افتد. (۰/۰) صفحه ۱۸۲	۰/۵
۲۶	پشت بیمار قرار بگیرید و دو دست خود را به صورت حلقه دور بیمار قرار دهید، یک دستان را مشت گنید (۰/۰) (الگشت شست به داخل دست خم می شود و انگشتان دور شست قرار می گیرد) و از زیر دستان مصدوم روی قفسه سینه قرار دهید (۰/۰)، دست دیگر را روی دست قبلی گذاشته و با یک حرکت سریع قفسه سینه را به داخل و بالا بفشارید (۰/۰). این حرکت را چندین بار تکرار گنید تا جسم به بیرون پرتاپ شود. (۰/۰) صفحه ۱۸۱	۱
	"درنهایت، نظر همکاران محترم صائب است"	۲۰
	جمع نمرات	