


باسمه تعالی

سؤالات امتحان نهایی درس : ریاضی ۳	رشته : علوم تجربی	ساعت شروع : ۸ صبح	تعداد صفحه: ۲
نام و نام خانوادگی :	پایه سوم متوسطه	تاریخ امتحان: ۱۳۹۸/۶/۹	مدت امتحان: ۱۲۰
دانش آموزان بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسر کشور در نوبت شهریور ماه سال ۱۳۹۸		مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی http://aee.medu.ir	

ردیف	توجه : استفاده از ماشین حساب ساده ( دارای چهار عمل اصلی ، جذر و درصد ) بلامانع است.	نمره
۱	جاهای خالی را با عبارت مناسب پر کنید. الف) مجموعه‌ی شامل همه حالت‌های ممکن در به وقوع پیوستن یک پدیده‌ی تصادفی را ..... می‌نامیم. ب) سه سکه را باهم می‌اندازیم. فضای نمونه‌ای این آزمایش تصادفی دارای ..... عضو است. پ) هر زیرمجموعه فضای نمونه‌ای را، یک ..... می‌نامیم. ت) اگر $A, B$ دو پیشامد از فضای نمونه‌ای $S$ باشند و $A \cap B \neq \emptyset$ در اینصورت $A, B$ را دو پیشامد ..... می‌نامیم.	۱
۲	یک سکه و یک تاس را باهم پرتاب می‌کنیم: الف) فضای نمونه‌ای این تجربه‌ی تصادفی را بنویسید. ب) پیشامدی را که در آن تاس زوج یا سکه پشت بیاید را بیابید.	۱/۲۵
۳	اگر $P(A) = \frac{1}{3}, P(B') = \frac{3}{4}$ و $A, B$ دو پیشامد ناسازگار باشند حاصل $P(A \cup B)$ را به دست آورید.	۱
۴	در جعبه‌ای ۶ لامپ سالم و ۴ لامپ معیوب موجود است. سه لامپ را به تصادف و هم‌زمان خارج می‌کنیم. احتمال آنکه لامپ‌ها از یک نوع باشند را بیابید.	۰/۷۵
۵	نامعادله زیر را حل کرده و مجموعه جواب را روی محور اعداد حقیقی نشان دهید. $2 < \frac{x}{2} + 1 < 4$	۱
۶	تابع $f(x) = \begin{cases} x+1 & x < -1 \\ x^2 & x \geq -1 \end{cases}$ داده شده است: الف) نمودار $f$ را رسم کنید. ب) دامنه تابع $f$ را به دست آورید.	۱
۷	دامنه تابع $f(x) = \tan(x + \frac{\pi}{3})$ را بیابید.	۰/۷۵
۸	توابع $f(x) = \frac{x}{x-2}$ و $g(x) = \sqrt{x}$ داده شده اند. حاصل $(f+g)(4)$ را به دست آورید.	۰/۷۵
۹	توابع $f(x) = x-2$ و $g(x) = \sqrt{1+x}$ مفروض اند. دامنه تابع $f \circ g$ را تعیین کنید.	۰/۷۵
۱۰	عبارت $\sin(x + \frac{\pi}{4})$ را ساده کنید.	۰/۷۵

«ادامه سؤالات در صفحه بعد»

سؤالات امتحان نهایی درس : ریاضی ۳	رشته : علوم تجربی	ساعت شروع : ۸ صبح	تعداد صفحه: ۲
نام و نام خانوادگی :	پایه سوم متوسطه	تاریخ امتحان: ۱۳۹۸/۶/۹	مدت امتحان: ۱۲۰
دانش آموزان بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسر کشور در نوبت شهریور ماه سال ۱۳۹۸		مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی http://aee.medu.ir	

ردیف	توجه : استفاده از ماشین حساب ساده ( دارای چهار عمل اصلی ، جذر و درصد ) بلامانع است.	نمره
۱۱	با استفاده از نمودار زیر حدهای خواسته شده را ( در صورت وجود) محاسبه کنید. الف) $\lim_{x \rightarrow -2^+} f(x)$ ب) $\lim_{x \rightarrow -2^-} f(x)$ پ) $\lim_{x \rightarrow -2} f(x)$ 	۰/۷۵
۱۲	حدهای زیر را محاسبه کنید. الف) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x} - 1}{x^2 - 1}$ ب) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{7x^2 + 6x}{3x^2 + x - 4}$ پ) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 4x}{\tan 8x}$ ت) $\lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{x+1}{9-x^2}$	۳
۱۳	اگر به ازای هر $x \in (-\pi, \pi)$ داشته باشیم: $3 - \cos^2 x \leq f(x) \leq 4 - \tan(\frac{x}{2})$ حد تابع $f(x)$ وقتی $x \rightarrow \frac{\pi}{2}$ را بدست آورید.	۰/۷۵
۱۴	پیوستگی تابع $f(x) = \begin{cases} 3[x] + 4 & x \geq -2 \\  2x + 4  & x < -2 \\ x + 2 \end{cases}$ در نقطه $x = -2$ را بررسی کنید.	۱/۵
۱۵	با استفاده از تعریف مشتق، مشتق تابع $f(x) = \sqrt{x-1}$ را در $x_0 = 5$ به دست آورید.	۱
۱۶	مشتق توابع زیر را به دست آورید. (ساده کردن مشتق الزامی نیست) الف) $f(x) = \frac{-2}{x^2 + 6x}$ ب) $g(x) = 3 \sin^2(5x) - 4 \tan(x)$ پ) $h(x) = \sqrt{5x+3}$ ت) $k(x) = (1+x^2)(7x-4)^2$	۳
۱۷	معادله حرکت متحرکی به صورت $x(t) = 2t^2 - 5t + 1$ است. سرعت متوسط این متحرک را در فاصله زمانی $[0, 3]$ تعیین کنید.	۱
۲۰	موفق باشید.	جمع نمره